

Desinfektions- und Reinigungsplan Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe

Persönliche Hygiene

Was	Wann	Womit	Wie	Wer
Händedesinfektion	Vor und nach Übungen an Übungsgeräten. Nach Toilettenbesuch	Händedesinfektionsmittel aus Desinfektionsmittelspendern oder aus 100 ml Flasche.	Ausreichende Menge 30 Sek auf trockenen Händen verreiben (Fingerkuppen und -zwischenräume Nagelbetten beachten), trocknen lassen. (ggf. Handwaschung siehe unten).	Ausbilder
	Bei sichtbarer Kontamination.	Händedesinfektionsmittel aus Desinfektionsmittelspendern oder aus 100 ml Flasche.	Mit Desinfektionsmittel getränkten Einmalhandtuch grobe Verunreinigung entfernen. 2 x anschließend Händedesinfektion durchführen, anschließend Hände waschen.	Ausbilder

Geräte und Hilfsmittel

Was	Wann	Womit	Wie	Wer
Masken für Beatmungspuppen	Nach jedem Teilnehmer	Instrumentendesinfektionsmittel Wechseln und in Sammelbehälter legen. Am Ausbildungsende Masken ggf. zerlegen, reinigen und in Instrumentendesinfektionsmittel einzulegen. Nach der EWZ mit Leitungswasser abspülen.	Wechseln und in Sammelbehälter legen. Am Ausbildungsende Masken ggf. zerlegen, reinigen und in Instrumentendesinfektionsmittel einzulegen. Nach der EWZ mit Leitungswasser abspülen. Ergänzende Hinweise aus Hygieneplan beachten.	Ausbilder
Luftbeutel	Nach jeder Übung.	.	Entfernen, vernichten, ersetzen	Ausbilder
Kopf, Gesicht, Hals und Körper	Nach Ausbildung.	Flächendesinfektionsmittel	Abwischen	Ausbilder
Bekleidung des Trainers.	1 mal Quartal	In Waschmaschine bei 60 Grad Abweichende Herstellerangaben beachten	Waschen	Ausbilder
Helme	Nach Ausbildung	Flächendesinfektionsmittel	Abwischen	Ausbilder

Desinfektions- und Reinigungsplan Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe

AED Trainingsgerät	Nach Ausbildung	Flächendesinfektionsmittel	Abwischen	Ausbilder
Einweg Übungsmaterialien	Nach Ausbildung		Entsorgen	Jeder Teilnehmer
Decken	Nach Ausbildung	In Waschmaschine bei 60 Grad	Waschen	Ausbilder

Hinweise

1. Grundsätzlich gilt, dass alle Flächen und Gegenstände bei Kontamination mit Blut, Ausscheidungen oder sonstigem erregershaltigem Material sofort desinfiziert werden müssen.
2. Bei Kontakt mit Desinfektionslösungen und Konzentraten müssen zur Vermeidung von Hautreizungen Handschuhe getragen werden (Schutzhandschuhe mit langer Stulpe). Eine regelmäßige Handpflege mindestens zweimal täglich mit einem Hautpflegemittel ist dringend zu empfehlen.
3. Den Desinfektionslösungen dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
4. Eine Wischdesinfektion muss als Nass-Wischverfahren durchgeführt werden.
5. Durchgeführte Desinfektionsmaßnahmen sind mit Datum zu protokollieren.